






NOTAS!

NOTAS!

AVES PLAYERERAS



*Aprende y diviértete coloreando estas ilustraciones de algunas aves playeras que se encuentran en el litoral central de Chile.



PLAYERO BLANCO

**Calidris alba*



• DISTRIBUCIÓN EN CHILE

Visitante de verano: Arica a Magallanes.

• ALIMENTACIÓN

Pequeños moluscos, crustáceos, gusanos poliquetos; insectos adultos, sus larvas y crisalidas.

¿Cómo es de Apariencia?


El plumaje es grisáceo en corona y dorso. Frente, garganta, cuello y abdomen son de color blanco. Patas y pico de color negro. Los ejemplares juveniles poseen tonalidades más oscuras en el dorso, con alas más negras.

• REPRODUCCIÓN

Hemisferio norte. *Nidifica en una depresión suave en tierra desnuda o piedras, con hojas secas o líquenes. Pone de 3 a 4 huevos, de colores oliváceos o azulados, con motas pardas.

DÓNDE HABITA?

habita playas exteriores. Suele ser un ave costera, aunque algunos ejemplares se detienen en las orillas de los lagos.



De todos los playeros que migran durante el invierno boreal hacia el Sur, el Playero blanco es el mas abundante. Se comienzan a ver normalmente en las zonas costeras por el mes de Septiembre, llegando en la zona austral incluso hasta Canal Beagle.

PILPILÉN

**Haematopus palliatus*



del Uj. P. Inter. Anota...

*ESPACIO CREATIVO

• DISTRIBUCIÓN EN CHILE

Desde Arica a Chiloé, con menor presencia hacia el sur hasta el Estrecho de Magallanes.

• ALIMENTACIÓN

Mejillones, lapas y cangrejos en las costas rocosas; poliquetos marinos sobre sustratos blandos costeros. En zonas interiores, principalmente lombrices y larvas de insectos.

¿Cómo es de Apariencia?

Posee cabeza, cuello, espalda y pecho negro brillante. Abdómen, supra-caudales, subcaudales y axilares de color blanco, posee un Pico rojo a rojo anaranjado, patas blanquesinas a rosadas, ojos amarillos con círculo periocular anaranjado.


• REPRODUCCIÓN

*Nidifica en una depresión en un suelo de conchuela, arena, pasto corto o algas muertas, sobre una loma con hierbas, a veces al abrigo de una planta cercana.

*pone de 1 a 2 huevos, de color oliva, finamente manchados de negro y pardo.

DÓNDE HABITA?

Costas, islotes, planicies, llanos y campos húmedos.



* Mide 40-44cm.

{ Por el tipo de alimento es que también es conocido como "ostrero", "cazador de ostras", las que busca entre rocas y los bajos al bajar la marea. }

CHORLO DE COLLAR

**Charadrius collaris*



• DISTRIBUCIÓN EN CHILE ≡

Atacama hasta la región de Los Lagos

• ALIMENTACIÓN ≡

Gusanos, larvas, insectos, poliquetos, pequeños crustáceos.


¿Cómo es de Apariencia?

Frente blanca. Corona anterior negra. Corona posterior, nuca y cuello posterior acanelado. Garganta, cuello anterior, pecho y abdomen blancos. Línea fina negra desde el pico a la nuca pasando por el ojo. Línea gruesa negra dividiendo la parte blanca entre el cuello y pecho, posee un pico negro. Patas anaranjado-amarillentas.

• REPRODUCCIÓN ≡

Nidifica en una depresión en el suelo, en donde coloca de 2 a 4 huevos grandes.

Estas aves son nidífugas, lo que significa que apenas eclosionan los huevos, los polluelos salen a buscar su propio alimento.



QUELTEHUE

**Vanellus chilensis*



• DISTRIBUCIÓN EN CHILE

Copiapó hasta Chiloé y Llanquihue, existen registros en Antofagasta.

• ALIMENTACIÓN

Básicamente insectívora, también se alimenta de semillas.

¿Cómo es de Apariencia?

Su frente, garganta y pecho son de color negro, abdomen color blanco, Dorso gris con brillo parduzco metálico. Cobertoras alares grises con brillos tornasoles. Posee un pico de color rojo con punta negra, patas rojas y ojos rojos.


• REPRODUCCIÓN

Su época de reproducción es muy temprana, comenzando a principios de Julio, es decir, en pleno invierno. Durante esta época se vuelven muy celosos y agresivos, cuidando tanto la nidada como los polluelos.

*Nidifica en una depresión en el suelo que suele cubrir con algunos pastos secos. Los huevos, de 3 a 4, son grandes en relación al tamaño del ave, son de tono café suave a verdoso suave, cubiertos por grandes manchas oscuras.

¿Dónde Habita?

Siempre asociado a cuerpos de agua como orillas de lagos, lagunas, tranques, vegas, también en la costa marina, en las playas, pero además en tierras agrícolas, praderas húmedas y secas.



Entre los numerosos atributos de esta ave, se dice que son buenos jardineros, ya que, dada su alimentación, controla la población de insectos en los prados y jardines.



FUENTES

Aves de Chile, Playero Blanco.(-).<https://www.avesdechile.cl/132.htm>

Aves de Chile, Pilpilén.(-).<https://www.avesdechile.cl/004.htm>

Aves de Chile, Chorlo de Collar(-).<https://www.avesdechile.cl/264.htm>

Aves de Chile, Queltehue.(-).<https://www.avesdechile.cl/049.htm>

Creación de láminas

Diseño e Ilustración

Fernanda Cortés Guzmán

**Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación para fines educativos u otros fines no comerciales, siempre que se cite la fuente y su respectivo autor.*

